



MUTUAL DE SEGURIDAD

# PENTACLOROFENOL Y SUS SALES SODICAS

MUTUAL  
0043

*2043-*  
CAMARA CHILENA DE  
LA CONSTRUCCION  
Centro Documentación

GERENCIA PREVENCIÓN DE RIESGOS  
DEPTO. DE HIGIENE INDUSTRIAL

## INTRODUCCION

El pentaclorofenol y sus sales sódicas son productos altamente tóxicos, capaces de ingresar a su organismo a través de la piel, durante el proceso respiratorio o por ingestión; provocando efectos locales y generalizados que en ciertos casos pueden ser mortales.

¡CUIDESE LEYENDO Y PRACTICANDO LAS SIGUIENTES MEDIDAS!

1. INSTRUYASE SOBRE  
EL PRODUCTO



2. ALMACENAMIENTO  
DE PRODUCTOS

- Mantenga envases  
tapados, con etiquetas  
y bajo llave.



SEGURIDAD LABORAL  
SUBSTANCIAS TOXICAS

### 3. PREPARACION DE SOLUCIONES



- Dosifique con  
guantes, colete y botas  
de caucho sintético  
o goma

- Use protección  
respiratoria




- Evite derrames, en caso de ocurrir limpie de inmediato



- Destruya los envases vacíos y entierrelos por lo menos a 2 mts. de profundidad. En el caso de quemarlos, hágalo en un lugar donde no contamine. Recuerde que los humos de combustión de estos productos, son tóxicos

#### 4. APLICACION (baño de pentaclorofenato)

- Use de preferencia  
inmersión mecánica



- Use pantallas  
antisalpicaduras

- No beba, fume o coma sin antes lavarse manos, cara y brazos con agua y jabón



### 5. APLICACION (con motobomba de espalda)



- Use ropa impermeable, guantes y botas



- Aplique a favor del viento

### 6. MANEJO MADERAS TRATADAS



- Use guantes, colete y botas de caucho sintético o goma.





- No fume, coma o beba sin antes lavarse manos, brazos y cara con agua y jabón



- Lave equipos después de la aplicación

- Lavar elementos de protección al término del turno.

## 7. MEDIDAS HIGIENICAS GENERALES

- Lávese manos, cara y brazos antes de comer, beber o fumar.
- Dúchese y cámbiese de ropa al final del turno.
- No trabaje con pentaclorofenato si tiene problemas renales o hepáticos.

## 8. PRIMEROS AUXILIOS

Contacto ojos: Lávese con agua corriente de 15 - 30 minutos y consulte oculista si hay lesión.

Contacto piel: Lávese con abundante agua y jabón y consulte médico si hay enrojecimiento, dolor, resequedad de la piel.

## 9. INGESTION

- Provocar vómito.
- Hacer lavado gástrico con agua o leche.
- Conseguir atención médica.



Autor.: Ministerio de Seguridad

Título: Proyecto de ley y bases técnicas

Nº top.: 2043.